



Инфекциозни заболявания при деца




Добре известно е, че вирусите са причинители на най-различни заболявания. Някои са познати на човечеството от древни времена. Вирусните заболявания по човека и животните са най-разнообразни. Особеност на вирусите е тяхната бърза изменчивост, поради което създаването на ваксини силно се затруднява. Ето и някои известни вирусни заболявания при човека:





Обриви при
децата. Шарка.



Скарлатина.

СКАРЛАТИНА ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ



Фарингит



Обложен език



Малинов език



Червени бузи



Обрив




Гъша кожа

Скарлатината е заболяване, засягащо най-вече деца от 1 до 9 годишна възраст, предимно в зимния период.

Болният се подлага на карантина с минимален срок 10 дни, а тези, които са били в контакт с тях - 7 дни.

Скарлатината се характеризира с внезапно бурно начало като първите симптоми обикновено са кашлица, висока температура, болки в гърлото, повръщане, болки по тялото, главоболие и тахикардия. Симптоми:

- повишена температура (около 39 °С);
- силна отпадналост, главоболие и повръщане;
- силно зачервено и болезнено гърло;
- увеличени сливици, често покрити с гнойни налепи;
- обрив под формата на дребни червени петна (появява се в слабините, разпространява се към гърдите, корема, шията);
- кожата става като настръхнала от студ (поради изпъкване на кожните папили) наподобява гъша кожа;
- езикът е малиново-червен.




Морбили

МОРБИЛИ



предотвратява се чрез
Ваксинация



Морбили е също вид шарка, която не засяга деца под 6 месечна възраст. Най-често от нея боледуват деца, малчугани между 2-4 години, но може да се прихване и по-късно на всяка възраст.


Инкубационният период на болестта е от 6 до 17 дни. Заразяването става по въздушно - капков път.

Преди въвеждане на имунизация срещу морбили инфекцията е разпространена по целия свят.




Симптоми:

Заболяването започва постепенно с повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, груба, не повлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 °С. Децата стават апатични, плачливи, губят апетит. След кратко понижение или нормализиране, температурата отново се повишава до 39 - 40 °С и се появява характерният макуло-папулозен обрив. Той се развива етапно, като първоначално обхваща лицето (*около носа и зад ушите*), шията и горната част на гръдния кош.



Варицела






Болестта е силно заразна и се характеризира със специфичен обрив.

Най-често боледуват деца между 5 и 9 години, но могат да бъдат засегнати хора във всяка възраст.

Варицелата протича по-тежко при възрастните.

Обикновено след преболедуване се развива доживотен имунитет срещу нея.

Предаването на вируса на варицела се извършва по въздушно-капков път



СИМПТОМИ:

ПЪРВИ СИМПТОМИ

WWW.GRIZALCHE.COM



Обща умора и
неразположение



Повишена
температура



Главоболие и болка
в мускулите



Липса на
апетит

ЕТАПИ НА ОБРИВА

WWW.GRIZALCHE.COM



1
Червени петна



2
Мехури



3



4



Висока температура (до 38-39 °C) и леко изразено възпаление на горните дихателни пътища. Общо чувство на слабост, отпадналост и загуба на апетит.

Обрив - първоначално се появяват надигнати червени петна, които преминават през зачервени пъпчици до мехурчета, пълни с бистра течност, впоследствие мехурчетата потъмняват, разпукват се и образуват малки язвички, от центъра към периферията им се образува коричка (круста). Тази еволюция трае около 10 -14 дни.

Кожният обрив при варицелата е силно сърбящ.

Рубеола

Причинителят на рубеола прониква в организма през лигавицата на дихателните пътища.

Оттам той попада в кръвта, чрез която достига до кожата, лимфните възли и до плода у бременни. Заболяването протича като цяло сравнително леко, но ако засегне бременни, води до тежки вътреутробни увреждания на плода. След преболедуване остава траен имунитет.

От 1992 г. в имунизационния календар ни е включена триваксината – Мобили, Паротит, Рубеола, която се прилага на 13 месечна възраст и втори път-при деца на 12 години.



Симптоми:




**Обрив при
рубеола**



Температура около 38,9°C или по-ниска;
Главоболие; Хрема; Зачервени и сърбящи очи;
Увеличени и чувствителни лимфни възли в
основата на черепа, задната част на врата и зад
ушите; Слаб розов обрив, който започва от лицето
и се разпространява бързо към торса, ръцете и
краката, като той ще избледнее в същия ред.

Розеола





Розеола инфантум е заразно заболяване, чийто източник може да бъде друг болен или здрав вирусоносител.

От розеола боледуват само деца до 3 годишна възраст, макар че съществуват много редки случаи на заразен възрастен.

Съществува сезонност на заболяването като най-бурно вирусът се разпространява през есента и пролетта.

Дете, боледувало от розеола, няма опасност да се зарази отново тъй като изгражда траен имунитет срещу болестта. Предава се по въздушно-капков път, чрез секрети, отделяни от горните дихателни пътища на заразен човек, вирусът се разпръсква в околната среда.



Симптоми:

Повишаване на температурата до 38-39 °С

Уголемени шийни възли, червени петна предимно по тялото и по –

рядко по крайниците и лицето.

Общото състояние като цяло е запазено.





„Ако можех бих направил заразно здравето, вместо болестите.“

Ингерсол